

# Forticam® 3B

## COMPOSICIÓN.

Cada cápsula de FORTICAM®3B contiene meloxicam 15 mg, tiamina 100 mg (vitamina B1), piridoxina 100 mg (vitamina B6), cianocobalamina 5.000 µg (vitamina B12), excipientes c.s.

## CLASE TERAPÉUTICA O FARMACOLÓGICA.

Meloxicam, combinaciones. Código ATC: M01AC56

## FORMA FARMACÉUTICA.

Cápsula.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antiinflamatorio, antineurítico, analgésico.

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

FORTICAM®3B está indicado en patologías neuríticas secundarias a afecciones musculoesqueléticas con intenso componente inflamatorio. Artritis reumatoidea intraarticular y extraarticular.

## PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS.

FORTICAM®3B combina las propiedades analgésicas y antiinflamatorias de meloxicam, con la reconocida acción neurotrófica de las vitaminas B1 y B6, a las cuales se suma de forma sinérgica la acción antiálgica de la vitamina B12. Meloxicam a diferencia de otros oxicam, actúa de forma preferente inhibiendo la enzima ciclooxigenasa-2, produciendo menores efectos secundarios a nivel gastrointestinal y renal en relación a otros antiinflamatorios no esteroideos.

## POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN.

El médico debe indicar la posología y el tratamiento en cada caso particular. La dosis usual recomendada en adultos es de 1 cápsula cada 24 horas.

## CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva, hemorragia esofágica, úlcera péptica activa, hemorragia cerebral. Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ambas en fase activa. Insuficiencia cardíaca, renal y/o hepática grave.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Informar a su médico acerca de los medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales que está tomando. Úlcera gastroduodenal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Las afecciones hematológicas y los problemas de coagulación requieren supervisión constante. Especial precaución en pacientes con insuficiencia renal, cardíaca, hipovolemia y en aquellos tratados con diuréticos.

## EMBARAZO Y LACTANCIA.

El médico tratante deberá determinar el riesgo/beneficio del uso de este fármaco durante el periodo de embarazo y lactancia.

## REACCIONES ADVERSAS.

Puede presentarse dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, flatulencia, anorexia. Ocasionalmente cefalea, mareos o vértigo, erupciones cutáneas, urticaria, elevación de las aminotransferasas séricas, proteinuria, aumento de los niveles plasmáticos de urea y creatinina. En pacientes con psoriasis la vitamina B12 puede producir enrojecimiento y ardor en la piel, así como una agravación de los síntomas de la psoriasis.

## SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL.

No se han descrito casos de sobredosis a la dosis recomendada. Los signos y síntomas asociados a sobredosis por AINEs reportan náuseas, vómitos, dolor en epigastrio, hemorragia gastrointestinal y en casos de intoxicación grave se puede presentar hipertensión, falla renal y hepática aguda, depresión respiratoria y coma. Es posible acelerar la eliminación de meloxicam administrando 4 g de colestiramina vía oral 3 veces al día.

Las sobredosis por vitaminas hidrosolubles son poco frecuentes, debido a su facilidad de eliminación por vía renal, pero se conoce que la administración de piridoxina de forma prolongada y altas dosis induce a la aparición de síndromes neuropáticos, fotosensibilidad en piel, dolor de cabeza, letargo y trastornos respiratorios.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al centro médico más cercano.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Meloxicam puede aumentar el efecto de anticoagulantes orales y heparina, la toxicidad hematológica de metotrexato, el efecto hipoglucemiante de sulfonilureas, la concentración plasmática de digoxina y/o litio, la nefrotoxicidad de ciclosporina. El uso simultáneo con ASA reduce recíprocamente la biodisponibilidad.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Verificar la fecha de vencimiento impresa en el envase antes de la administración del medicamento. Venta bajo prescripción médica. No contiene gluten.

"Las consultas médicas periódicas ayudan a detectar enfermedades a tiempo y contribuyen a una mejor calidad de vida".

Nuestro número de servicio de atención al consumidor 800 16 2222 se encuentra disponible para brindar mayor información de nuestros productos y servicios.

Comunicarse con nuestro Centro de Farmacovigilancia 800 16 2636 en caso de presentarse alguna reacción medicamentosa adversa.

## PRESENTACIÓN.

Estuche x 30 cápsulas



## FORTIER

*Un monde digne de nous.*



Qualité Certifiée

Producido por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle Víctor Eduardo 2293, La Paz - Bolivia. Industria farmacéutica comprometida con la filosofía ESG (Ambiente, Social, Gobernanza) en un mundo donde los desafíos medioambientales y sociales son cada vez más representativos. Certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador Económico Autorizado (OEA), Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras.

Para aportar a un mundo digno de nosotros estamos socialmente comprometidos, promovemos la seguridad y salud en el trabajo, el cuidado del medio ambiente y la bioseguridad.

**FORTIER** Un mundo digno de nosotros.

