

Forticam B12 forte

COMPOSICIÓN.

Cada ampolla ámbar de **Forticam®B12 forte** x 3 mL contiene meloxicam 15 mg, vitamina B12 25.000 µg, excipientes: alcohol etílico, otros c.s.

CLASE FARMACOLÓGICA.

Meloxicam, combinaciones. Código ATC: M01AC56

FORMA FARMACÉUTICA.

Solución inyectable.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

I.M. profunda.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antiinflamatorio, analgésico, antineurítico.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS.

Meloxicam pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroides (AINEs), posee acción antiinflamatoria y analgésica, generando un mínimo efecto sobre la mucosa gastrointestinal y los riñones, gracias a su condición de inhibidor preferencial de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2), inhibiendo la biosíntesis de prostaglandinas presentes en la zona de inflamación.

Vitamina B12 posee acción antineurítica y disminuye el dolor de origen neuropático. Esto se atribuye a un efecto sobre la conducción axonal, pues bloquea selectivamente la conducción del dolor. Este efecto puede ser prolongado por su interacción con los receptores opiáceos o con los neurotransmisores inhibitorios, como el GABA. Se consigue mayor acción analgésica y antineurítica a mayor concentración de vitamina B12, la cual actúa como coenzima en varias funciones metabólicas, incluido el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Indicado en dolores músculo esqueléticos asociados a inflamación. Afecciones degenerativas del raquis. Ciática. Lumbalgia. Neuritis de diversa etiología. Dolores neurálgicos, parestia facial, neuralgia del trigémino, síndrome hombro mano, neuralgia intercostal. Dolores postrumáticos, lesiones músculo esqueléticas. Enfermedades reumáticas inflamatorias: Artritis, gota, osteoartritis, espondilitis anquilosante, bursitis, tendinitis. Radiculitis. Herpes Zóster.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología media se aconseja 1 ampolla cada 24 horas por vía intramuscular profunda, preferentemente intraglútea.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Hemorragia digestiva, hemorragia esofágica, úlcera péptica activa, hemorragia cerebral. Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ambas en fase activa. Insuficiencia cardíaca, renal y/o hepática grave. Pacientes con diabetes hemorrágica y otros trastornos de la coagulación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Controlar la administración en pacientes con trastornos hematopoyéticos de la coagulación, afectados por enfermedades gastrointestinales o cardiovasculares. Por contener alcohol etílico evitar la administración en niños, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia. Vitamina B12 pigmenta la orina de color rojizo, que desaparece con la finalización del tratamiento.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

Evitar el uso de este fármaco durante los períodos del embarazo y de la lactancia, salvo indicación médica, previa evaluación riesgo/beneficio.

REACCIONES ADVERSAS.

En general y a dosis recomendadas el fármaco es bien tolerado. Meloxicam presenta menos efectos secundarios a nivel gastrointestinal, renal y cardíaco comparado a otros AINEs no preferenciales. Puede presentarse dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, flatulencia, cefalea, fatiga, insomnio, mareos, prurito. En pacientes afectados por psoriasis, vitamina B12 puede producir enrojecimiento y ardor en la piel, así como una agravación de los síntomas.

SOBREDOSIFICACIÓN.

En caso de una sobredosificación concurrir al centro médico más cercano.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Meloxicam puede aumentar el efecto de anticoagulantes orales y heparina, la toxicidad hematológica de metotrexato, el efecto hipoglucemiante de sulfonilúreas, la concentración plasmática de litio, la nefrotoxicidad de ciclosporina; el uso simultáneo con ASA reduce recíprocamente la biodisponibilidad. Alcohol, corticosteroides, corticotropina y suplementos de potasio. Agentes anti diabéticos orales o insulina.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y RECOMENDACIONES.

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No utilizar este medicamento después de su fecha de vencimiento. Venta bajo prescripción médica.

“Las consultas médicas periódicas ayudan a detectar enfermedades a tiempo y contribuyen a una mejor calidad de vida”.

Nuestro número de servicio de atención al consumidor: 800 16 2222 se encuentra disponible para brindar mayor información de nuestros productos y servicios. Comunicarse con nuestro Centro de Farmacovigilancia: 800 16 2636 en caso de presentarse alguna reacción medicamentosa adversa.

PRESENTACIÓN.

Caja x 10 estuches unidosos



FORTIER

Un monde digne de nous.



Qualité Certifiée

Producido por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle Víctor Eduardo 2293, La Paz - Bolivia. Industria farmacéutica comprometida con la filosofía ESG (Ambiente, Social, Gobernanza) en un mundo donde los desafíos medioambientales y sociales son cada vez más representativos. Certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador Económico Autorizado (OEA), Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras.

Para aportar a un mundo digno de nosotros estamos socialmente comprometidos, promovemos la seguridad y salud en el trabajo, el cuidado del medio ambiente y la bioseguridad.

FORTIER Un mundo digno de nosotros.

