

Spasmox® Compuesto

no
contiene
gluten

COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto contiene propinox clorhidrato 20 mg, clonixinato de lisina 125 mg, excipientes c.s.

CLASE TERAPÉUTICA O FARMACOLÓGICA.

Antiespasmódicos en combinación con analgésicos. Código ATC: A03DC

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido recubierto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiespasmódico, analgésico.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

SPASMOX® Compuesto está indicado en cuadros espasmódicos del aparato digestivo que acompañan a esofagitis, úlcera gástrica, gastritis, síndrome diarreico, litiasis biliar. Cuadros espasmódicos del aparato genitourinario que acompañan a uretritis, cistitis, dismenorreas.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS.

Propinox es un antiespasmódico antagonista moderado y no selectivo de los receptores muscarínicos y con acción directa sobre el músculo liso visceral. Clonixinato de lisina es un analgésico antiinflamatorio no esteroide (AINE), con acción analgésica predominante. Su acción se desarrolla por inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Estudios recientes sugieren que dicha acción es predominante sobre la enzima catalizadora de la síntesis de prostaglandinas mediadoras de la inflamación (COX-2) con menor actividad sobre la enzima catalizadora de la síntesis de prostaglandinas de la mucosa gastrointestinal y de los riñones (COX-1), donde dichas sustancias ejercen una función protectora.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN.

Según prescripción médica. Se recomienda en adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 2 comprimidos cada 6 a 8 horas, sin sobrepasar la dosis máxima de 6 comprimidos en 24 horas.

Ingerir los comprimidos recubiertos enteros, sin masticar y con abundante líquido.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Úlcera péptica activa o hemorragia gastroduodenal. Antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, angioedema o urticaria ocasionados por la administración de ASA u otros AINEs. Glaucoma, hipertrofia de próstata o tendencia a la retención urinaria y estenosis pilórica orgánica. Atonia intestinal, ileo paralítico. Colitis ulcerosa. Miastenia gravis.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Informar a su médico acerca de los medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales que está tomando. Administrar con precaución en pacientes con predisposición a la obstrucción intestinal o urinaria; tirotoxicosis, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y estenosis mitral; antecedentes digestivos, de úlcera péptica gastroduodenal o gastritis. Evitar en pacientes con reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

Contraindicado en período de embarazo y lactancia, salvo indicación médica.

REACCIONES ADVERSAS.

Epigastralgia, acidez, náuseas, vómitos, sequedad bucal, constipación,

diarrea, visión borrosa, mareos, somnolencia, cefalea, palpitaciones o taquicardia, modificables mediante un ajuste posológico.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL.

No se han informado casos de sobredosis, sin embargo, ante una posible sobredosificación, concurrir al centro de salud más cercano para que el médico realice una cuidadosa evaluación clínica del paciente, y decida la realización o no del tratamiento de rescate.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Propinox: anticolinérgicos, antidiarreicos adsorbentes, antiácidos, ketoconazol, itraconazol.

Clonixinato de lisina: AINEs, anticoagulantes orales, ticlopidina, heparina, trombolíticos, litio, metotrexato, diuréticos, antihipertensivos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y RECOMENDACIONES.

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Verificar la fecha de vencimiento impresa en el envase antes de la administración del medicamento. Venta bajo prescripción médica. No contiene gluten.

"Las consultas médicas periódicas ayudan a detectar enfermedades a tiempo y contribuyen a una mejor calidad de vida".

Nuestro número de servicio de atención al consumidor 800 16 2222 se encuentra disponible para brindar mayor información de nuestros productos y servicios.

Comunicarse con nuestro Centro de Farmacovigilancia 800 16 2636 en caso de presentarse alguna reacción medicamentosa adversa.

PRESENTACIÓN.

Estuche x 100 comprimidos



FORTIER

Un monde digne de nous.



Qualité Certifiée

Producido por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle Víctor Eduardo 2293, La Paz - Bolivia. Industria farmacéutica comprometida con la filosofía ESG (Ambiente, Social, Gobernanza) en un mundo donde los desafíos medioambientales y sociales son cada vez más representativos. Certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador Económico Autorizado (OEA), Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178), Operaciones Bioseguras.

Para aportar a un mundo digno de nosotros estamos socialmente comprometidos, promovemos la seguridad y salud en el trabajo, el cuidado del medio ambiente y la bioseguridad.

FORTIER Un mundo digno de nosotros.

