

Ulcra^x®

no contiene gluten
no contiene azúcar

COMPOSICIÓN.

Cada 10 mL de suspensión contiene sucralfato 2 g, excipientes: glicerina, parabenos, otros c.s.

CLASE TERAPÉUTICA O FARMACOLÓGICA.

Sucralfato. Código ATC: A02BX02

FORMA FARMACÉUTICA.

Suspensión.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antiluceroso, gastroprotector.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS.

Ulcra^x® está indicado para el tratamiento de esofagitis por reflujo, gastritis, gastritis aguda erosiva (principalmente aquellas producidas por AINEs), profilaxis de hemorragia gastrointestinal, reflujo gastroesofágico o duodeno gástrico, tratamiento y profilaxis de úlcera gástrica o duodenal.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS.

Ulcra^x® es un antiluceroso no sistémico, citoprotector de la mucosa gastroduodenal. Mediante el contacto con la mucosa forma un gel, que se adhiere firmemente a las proteínas del área lesionada, ofreciendo una efectiva protección contra el ácido clorhídrico (HCl) y la pepsina. Además, produce inhibición de la pepsina y sales biliares por absorción de las mismas. La presencia de sucralfato sobre la lesión ulcerada disminuye la retrodifusión del ácido, protegiendo la mucosa. Incrementa la producción del factor de crecimiento epidérmico y de los fibroblastos, favoreciendo estos últimos la regeneración epitelial con la consecuente cicatrización del nicho ulcerado.

POSOLÓGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN.

Según prescripción médica. Se recomienda 10 mL cada 12 horas, media hora antes de ingerir los alimentos o dos horas después.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Informe a su médico sobre los medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales que está tomando.

Sucralfato puede producir un aumento en el aporte de aluminio al organismo con la administración concomitante con antiácidos que contienen aluminio. Sucralfato debe administrarse con extrema precaución y por cortos períodos de tiempo en pacientes con insuficiencia renal o en diálisis por la posibilidad de acumulación de aluminio y toxicidad. Por contener glicerina puede provocar dolor de cabeza, molestias estomacales, diarrea. Por contener parabenos puede causar urticaria y broncoespasmo.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

Sucralfato debe ser administrado durante el embarazo solamente en caso de estricta necesidad. No se ha determinado la excreción de sucralfato a través de la leche materna, razón por la cual debe ser prescrito con precaución durante la lactancia.

REACCIONES ADVERSAS.

En general el tratamiento es bien tolerado, ocasionalmente podrían presentarse constipación, náuseas, diarrea, boca seca, lumbalgia.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL.

Indigestión, náuseas, vómitos, dolor abdominal que en caso de presentarse deben tratarse en forma sintomática. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al centro médico más cercano.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Sucralfato puede disminuir la absorción de tetraciclina, tobramicina, colistina, anfotericina B, fenitoína, sulpirida, digoxina, ranitidina, ketoconazol, teofilina de liberación retardada, ácido quenodeoxicólico, ácido ursodeoxicólico y levotiroxina. Administrar 2 horas después en el tratamiento concomitante con fluoroquinolonas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

No utilizar este medicamento después de su fecha de vencimiento.

Venta bajo prescripción médica. No contiene azúcar. No contiene gluten.

"Realizar consultas médicas periódicas ayuda a detectar enfermedades a tiempo y contribuye a una mejor calidad de vida".

Nuestro número de servicio de atención al consumidor: 800 16 2222 se encuentra disponible para brindar mayor información de nuestros productos y servicios.

Comunicarse con nuestro Centro de Farmacovigilancia: 800 16 2636 en caso de presentarse alguna reacción medicamentosa adversa.

PRESENTACIÓN.

Frasco x 200 mL



FORTIER

Un monde digne de nous.



Qualité Certifiée

Producido por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle Víctor Eduardo 2293, La Paz - Bolivia. Industria farmacéutica comprometida con la filosofía ESG (Ambiente, Social, Gobernanza) en un mundo donde los desafíos medioambientales y sociales son cada vez más representativos. Certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador Económico Autorizado (OEA), Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras.

Para aportar a un mundo digno de nosotros estamos socialmente comprometidos, promovemos la seguridad y salud en el trabajo, el cuidado del medio ambiente y la bioseguridad.

FORTIER Un mundo digno de nosotros.

